

Hirdetés

## INFANRIX-IPV + HIB por szuszpenziós injekcióhoz és szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben

Hirdetés



## INFANRIX-IPV + HIB por szuszpenziós injekcióhoz és szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben betegtájékoztatója

Adatvédelem

## alkalmazható?

Az Infanrix-IPV+Hib szuszpenziós injekció diftéria, tetanusz, pertusszisz, poliomielitisz és b típusú *Haemophilus influenzae* (Hib) elleni aktív immunizálásra alkalmas csecsemők és kisgyermek részére 2 hónapos kortól 3 éves korig. Az oltás a szervezetben ellenanyag képződést indít el, ami védelmet biztosít ezekkel a megbetegedésekkel szemben.

Az Infanrix-IPV+Hib szuszpenziós injekció egy adagos két komponensű készítmény: az egyik komponens a DTPa-IPV folyékony szuszpenzió (0,5 ml) előretöltött fecskendőben, a másik komponens a liofilizált Hib injekciós üvegben. Az összetevőket össze kell keverni. Felhasználás előtt a folyékony DTPa-IPV-vel fel kell oldani a liofilizált Hib port.

- **Diftéria (torokgyík):** A diftéria főleg a légutakat és néha a bőrt támadja meg. Általában a légutak gyulladását (nyálkahártya duzzanatát) váltja ki, súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okozva. A baktérium toxint (mérgező anyagot) is termel, ami idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, sőt halált is okozhat.

- **Tetanusz (merevgörcs):** A tetanusz baktérium a bőr sérülésein (vágás, karcolás, sebzés) keresztül jut a szervezetbe. A fertőzésre különösen hajlamosító sebek az égés, a csonttörés, a mély sebek és/vagy olyan sérülések, amelyek földdel, porral, állati ürülékkel szennyezettek vagy fa szálka okozta. A baktérium toxint (mérgező anyagot) termel, amely izommerevséget, fájdalmas izomösszehúzódásokat, görcsöt, sőt halált is okozhat. Az izomgörcs olyan erős lehet, hogy gerinctörést okozhat.

- **Pertusszisz (szamárköhögés):** A szamárköhögés erősen fertőző betegség. A légutakat érinti súlyos köhögési rohamot okozva, ami a normális légzést is megakadályozhatja. A köhögést gyakran "húzó" hang kíséri, ami után népies nevét kapta: szamárköhögés. A köhögés egy-két hónapig vagy még hosszabb ideig tarthat. A pertusszisz fülfertőzéseket,



- Ha gyermekének a korábbiakban valamilyen idegrendszeri problémája volt pertusszisz (szamárköhögés) elleni oltás beadása után 7 napon belül.
- Ha gyermeke egyéb gyógyszert szed, vagy az utóbbi napokban kapott valamilyen oltást.
- Ha gyermekének súlyos fertőzése, magas láza (38 °C felett) van. Ilyen esetekben a védőoltást el kell halasztani, amíg gyermeke meggyógyul. Enyhe fertőzés, mint köhögés, nem jelent problémát, de jelezze kezelőorvosának.

A fent említett esetekben Infanrix-IPV+Hib oltás nem adható be gyermekének.

### Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Infanrix -IPV+Hib alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával:

- ha gyermeke a korábbiakban Infanrix vagy más pertusszisz (szamárköhögés) elleni oltást kapott, és az valamilyen problémát okozott, különösen az alábbiakat:
  - magas láz (40 °C feletti) a beadást követő 48 órán belül;
  - ájulás vagy sokszerű tünet a beadást követő 48 órán belül;
  - folyamatos sírás 3 órán keresztül vagy tovább, a beadást követő 48 órán belül;
  - görcs/görcsroham lázzal vagy anélkül a beadást követő 3 napon belül;
- ha gyermekének véralvadási zavarai vannak, vagy könnyen alakul ki nála véraláfutás;
- ha gyermeke hajlamos lázas állapotban görcs/görcsroham kialakulására vagy a családban már tapasztaltak ehhez hasonlót;
- ha gyermekének légzési nehézségei vannak, keresse fel kezelőorvosát. Ez gyakrabban fordul elő az oltást követő első három napon, ha gyermeke koraszülött volt (a terhesség 28. hetében vagy az előtt született).
- amennyiben gyermeke még nem diagnosztizált vagy súlyosbodó idegrendszeri betegségben vagy nem megfelelően kezelt epilepsziában szenved. Az oltást a betegség kezelésének beállítását követően kell beadni.

Amennyiben kezelőorvosa fogja eldönteni, hogy melyik a legmegfelelőbb időpont és

Adatvédelem



Ájulás előfordulhat (különösen serdülőknél) bármilyen tűszúrás előtt vagy után. Ezért említse meg kezelőorvosának vagy a gondozását végző egészségügyi dolgozónak, ha már korábban tűszúrásnál gyermeke elájult.

### **Egyéb gyógyszerek és az Infanrix-IPV+Hib**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát a jelenleg vagy nemrégiben gyermeke által szedett vagy alkalmazott, valamint szedni vagy alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket, vagy oltást is.

Különösen fontos, hogy tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha:

- fertőzések kezelésére olyan gyógyszert szed, amely befolyásolja az immunrendszer működését. Lehetséges, hogy az Infanrix-IPV+Hib kevésbé lesz hatásos, ha gyermeke ilyen gyógyszereket szed.

Az Infanrix-IPV+Hib egyidőben adható más gyermekkori védőoltásokkal. Az egyes vakcinákat más beadási helyre fogják beadni.

### **Terhesség és szoptatás**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Mivel az Infanrix-IPV+Hib-et csak gyermekeknél alkalmazzák, soha nem adandó terhes vagy szoptató személynek.

### **Az Infanrix-IPV+Hib para-aminobenzoésavat, fenilanalint, nátriumot és káliumot tartalmaz**

Az Infanrix-IPV+Hib para-aminobenzoésavat tartalmaz, ami allergiás reakciókat (amelyek később jelentkeznek) és kivételes esetekben hörgőgörcsöt okozhat.

Adatvédelem



On a fenilketonuriának nevezett ritka genetikai rendellenességben szenved, amely során a fenilalanin felhalmozódik, mert a szervezet nem tudja megfelelően eltávolítani.

A készítmény kevesebb mint 1 mmol (23 mg) nátriumot tartalmaz adagonként, azaz gyakorlatilag "nátriummentes".

Ez a gyógyszer kevesebb mint 1 mmol (39 mg) káliumot tartalmaz adagonként, azaz gyakorlatilag "káliummentes".

### 3. Hogyan kell alkalmazni az Infanrix-IPV+Hib-et?

Gyermeke az első életévében az oltási naptárnak megfelelően két vagy három oltást fog kapni alapimmunizálás céljából. Mindegyik oltást különböző alkalommal kapja, legalább 4 hetes időközönként. Gyermekorvosa tájékoztatni fogja a következő oltás időpontjáról.

Amennyiben emlékeztető oltásként kapja gyermeke, gyermekorvosa erről tájékoztatni fogja.

Amennyiben elmulasztotta az esedékes oltást a tervezett időpontban beadatni, minél előbb beszéljen meg orvosával másik időpontot.

Győződjön meg arról, hogy gyermeke megkapta-e a szükséges oltásokat. Ellenkező esetben esetleg nem lesz teljesen védett a betegségek ellen.

Kezelőorvosa gyermekének izomba fogja az Infanrix-IPV+Hib oltást beadni.

Az oltást tilos vénába adni.



Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. A következő mellékhatások fordulhatnak elő ennél a vakcinánál:

### **Allergiás reakciók**

Ha gyermekénél allergiás reakció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz. A tünetek az alábbiak lehetnek:

- az arc duzzanata,
- alacsony vérnyomás,
- légzési nehézség,
- a bőr eltekintése,
- eszméletvesztés.

Ezek a reakciók általában az injekció beadása után nagyon rövid időn belül jelentkeznek. Ha ezek a reakciók az orvosi rendelő elhagyása után jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz. Az allergiás reakciók nagyon ritkák (10 000 oltásból legfeljebb 1 esetben fordulhatnak elő).

### **Azonnal forduljon kezelőorvosához, ha gyermekénél a következő tünetek közül bármelyik jelentkezik:**

- ájulás,
- eszméletvesztés,
- zavartság,
- görcsök.

Ha a fenti tünetek közül bármelyiket észleli, azonnal forduljon kezelőorvosához. Ezek a tünetek nagyon ritkák (10 000 oltásból legfeljebb 1 esetben fordulhatnak elő).



**Nagyon gyakori** (10 oltásból több mint 1 esetben fordulhatnak elő): étvágytalanság, 38 °C-os vagy annál magasabb láz, duzzanat, fájdalom és bőrpír az injekció beadásának a helyén, szokatlan sírás, nyugtalanság, ingerlékenység, álmoság, aluszékonyság.

**Gyakori** (10 oltásból legfeljebb 1 esetben fordulhatnak elő): hasmenés és hányás, kemény csomó az oltás helyén, nagy kiterjedésű duzzanat az oltás helyén

**Nem gyakori** (100 oltásból legfeljebb 1 esetben fordulhatnak elő): a nyaki, hónalji és ágyéki nyirokcsomók duzzanata (*lymphadenopathia*), köhögés, hörghurut (*bronchitis*), orrfolyás, felső légúti fertőzések, például megfázás, mandulagyulladás vagy gégegyulladás, kiütés, csalánkiütés, fáradtság, az oltott végtag duzzanata, néha beleértve a szomszédos ízületeket is, 39,5 °C-nál magasabb láz.

**Ritka** (1000 oltásból legfeljebb 1 esetben fordulhatnak elő): bőrkkiütés, viszketés.

A forgalomba hozatal után jelentett mellékhatások:

- vérlemezkék számának csökkenése;
- görcsök (lázzal vagy anélkül);
- ájulás;
- sokkszerű állapot;
- éretlen (a terhesség 28. hetében vagy az előtt született) koraszülötteknél az oltás beadása után 2-3 napig a légvételek között a normálisnál hosszabb szünetek jelentkezhet;
- az arc, nyelv, torok allergiás duzzanata (angioneurotikus ödéma);
- az egész oltott végtag duzzanata;
- hólyagok a beadás helyén;

allergiás reakciók.

Adatvédelem





Az Infanrix-IPV+Hib emlékeztető oltása megnövelheti az oltás helyén fellépő reakciók előfordulásának kockázatát. Ezek között előfordulhat a beadás helyén fellépő duzzanat, az egész oltott láb vagy kar duzzanata, amely néha áttérjedhet a szomszédos ízületekre is. Ezek a reakciók általában az oltás után 2 napon belül jelentkeznek, és 4 napon belül elmúlnak.

### Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest, Magyarország, honlap: <https://mellekhatas.ogyei.gov.hu/>

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

## 5. Hogyan kell az Infanrix-IPV+Hib-et tárolni?

Hűtőszekrényben (2 °C - 8 °C) tárolandó.

A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

Nem fagyasztható! Fagyasztással tönkremegy a szuszpenziós injekció.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejáratási idő (EXP:) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejáratási idő a készítés dátumától számított hónap utolsó napjára vonatkozik.

Adatvédelem



Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvizbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### Mit tartalmaz az Infanrix-IPV+Hib?

- A készítmény hatóanyagai:

Diphtheria (D), tetanus (T), acellularis pertussis (Pa), inaktivált poliomyelitis (IPV) és konjugált b típusú *Haemophilus influenzae* (Hib) vakcina (adszorbeált)

Az elkészített szuszpenziós injekció minden egyes adagja (0,5 ml) tartalmaz:

Diphtheria toxoid<sup>1</sup>  $\geq 30$  nemzetközi egység (NE) (25 Lf)

Tetanus toxoid<sup>1</sup>  $\geq 40$  nemzetközi egység (NE) (10 Lf)

*Bordetella pertussis* antigének:

Pertussis toxoid (PT)<sup>1</sup> 25 mikrogramm

Filamentózus haemagglutinin<sup>1</sup> 25 mikrogramm

Pertaktin<sup>1</sup> 8 mikrogramm

Inaktivált poliovírus (IPV)

1-es típus (Mahoney törzs)<sup>2</sup> 40 D-antigén egység

2-es típus (MEF-1 törzs)<sup>2</sup> 8 D-antigén egység

3-as típus (Saukett törzs)<sup>2</sup> 32 D-antigén egység

b típusú *Haemophilus influenzae* poliszacharid

(poliribozilribitol-foszfát) (PRP) 10 mikrogramm

tetanus toxoid hordozó fehérjéhez kötve kb. 25 mikrogramm

<sup>1</sup> Alumínium-hidroxidhoz kötött 0,5 mg Al<sup>3+</sup>  
Adatvédelem

- Egyéb összetevők: laktóz, nátrium-klorid, Medium 199 (stabilizátor, mely aminosavakat (köztük fenilanalint), ásványi sókat (köztük nátriumot és káliumot), vitaminokat (köztük para-aminobenzoésavat) és egyéb összetevőket tartalmaz), injekcióhoz való víz.

### Milyen az Infanrix-IPV+Hib külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

- Az Infanrix-IPV+Hib vakcina Infanrix-IPV összetevője fehér, tejszerű szuszpenzió előretöltött fecskendőben (0,5 ml).
- A vakcina Hib összetevője por injekciós üvegben.
- Mind a két összetevőt össze kell keverni közvetlenül az előtt, hogy az injekciót beadják a gyermekének.
- 1 adagos injekciós üvegben és előretöltött fecskendőben, külön tűvel vagy tű nélkül.
- Kiszerezések: 1× vagy 10×.
- Nem feltétlenül mindegyik kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Kiszerezés: 1x0,5 ml fecskendő 2 tűvel

Törzskönyvi szám: OGYI-T-9521/01



**Forgalomba hozatali engedély jogosultja:** GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Adatvédelem

pertussis, diphtheria toxoid,  
tetanus toxoid, pertussis  
toxoid, poliomyelitis vaccine,  
inactivated, haemophilus  
influenzae B vakcina

**ATC:** Diphtheria-hemophilus  
influenzae B-pertussis-  
poliomyelitis-tetanus

**Normatív TB támogatás:** ✘

**Vényköteles:** ✔

**Közgyógyellátásra adható:** ✘

**Patikán kívül vásárolható:** ✘

**EÜ támogatásra adható:** ✘

**EÜ Kiemelt támogatás:** ✘

**Üzemi baleset jogcím:** ✘

Ezek a gyógyszerek is érdekelhetik

[TWINRIX GYERMEK SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN](#) →

[COMIRNATY 30 MG/ADAG KONCENTRÁTUM DISZPERZIÓS INJEKCIÓHOZ](#) →

[FSME-IMMUN FELNŐTTEKNEK SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN](#) →

[APEXXNAR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN](#) →

**VARILRIX POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN** →

TÖBB MEGTEKINTÉSE

## PHARMINDEX

Az adatokat a PHARMINDEX gyógyszer-információs adatbázis szolgáltatja. © Vidal Next Kft. 2024

hirstart.hu



**Hirtelen óriási lett az érdeklődés egy lengyel város iránt**

Startlap Utazás



**Mióma: elrákosodhat a nők jóindulatú daganata**

HáziPatika



**A stroke-tól is védhet ez a zöldség**


HáziPatika



**Hatalmas áremelkedést vár a szakember, ne késlekedj tovább!**

NLC

hirstart.hu



**A járvány alatt ilyen sokat segítettek a kutyák**

HáziPatika



**Simon Kornél bevallotta, alkoholproblémák voltak**

NLC



**Visszatért a Balaton egyik ikonikus látványossága**

Startlap Utazás



**Jelek, hogy betegséget kaptunk el a háziállattól**

HáziPatika

hirstart.hu



**Endrei Judit vallomása a volt házasságáról**

NLC



**Megbecsült debreceni orvos fogadott el hálapénzt**

HáziPatika



**Omlós reszelt túros sütemény**

Nosalty



**A pandémia végével egyre többen költöznének vissza a fővárosba**

HáziPatika

hirstart.hu

## 12 főzelék, mely tejmentesen készül

Nosalty / 2024. 03. 19. 18:02 / Recept

Egy jó főzeléket mindig jó kanalazni, ha azonban laktózérzékenységgel küzdünk, akkor kicsit alakítani kell a receptet. Szerencsére ez egyáltalán nem lehetetlen.

Adatvédelem




Könnyekből sem volt hiány.


## 107 éves lesz Gizi néni

NLC / 2024. 03. 21. 06:37 / Egészség


Gizi néni 1917 áprilisában született Karcagon. Hamarosan a 107. születésnapját ünnepli, de ha az utcán látja sétálni az ember, ezt meg nem mondaná róla. Az idős néni, bár már a fél szemére vak, elképesztően aktív. Hetvenéves fiával és menyével él együtt egy pici lakásban, ahol nem a tévé vagy a rádió szól megállás nélkül. Gizi néni elképzelni sem t




Apró jelek, amik szív- és érrendszeri betegségekre utalnak




Ízlik a védelem a kutyádnak: FRONTPRO® rágótabletta (x)




Mennyire vagy tudatos, jó kutyatartó?





Enzimpótlással az emésztési gondok ellen (x)



Hatékony kezelés: a laborvizsgálat gyakran nem elég



A jólléted a tét: így tehetsz érte



Veszélyekre figyelmeztethet az orrunk

Olvassa el aktuális cikkeinket!




HOSSZÚ HÉTVÉGE

Ezek voltak a legnépszerűbb úti célok a hosszú hétvégén

A legjellemzőbbek a 2 éjszakás, 2 fős utazások voltak március 14-17. között.



MTI/HÁZIPATIKA.COM



ORVOSNÁL


Megbecsült debreceni orvos fogadott el hálapénzt



MTI/HÁZIPATIKA.COM


Adatvédelem





## Még mindig rengeteg a felelőtlen sofőr


P.L.



### SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE

## VR-szemüveg segíti a Semmelweis orvosait


MTI/HÁZIPATIKA.COM



### CSALÁDI HÁZ KONTRA LAKÁS

## A pandémia végével egyre többen költöznének vissza a fővárosba

N.M.M.



### VESZÉLYBEN

## Felfüggesztettet kapott a mentős egy halálos baleset miatt

I.A.



## Horgaszok egymast váltva mentettek életet

N.M.M.

### KISZÁRADÁS

## Nyaralás miatt magára hagyták a járókában, éhen halt a kislány

N.M.M.

MÉG TÖBB CIKK →

## Orvosmeteorológia



Fronthatás:

**Hidegfront**

Maximum: **+16 °C**

Minimum: **+1 °C**

Fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel. Az északnyugati tájak kivételével napközben átmenetileg elvékonyodhat, csökkenhet a fátyolfelhőzet, de a déli óráktól nyugat felől ismét növekszik, vastagszik a felhőtakaró. Délutánig csapadék nem várható, utána viszont a Dunántúlon, főleg annak nyugati felén, már helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A változó irányú szél este az északnyugati területeken északnyugatra fordul és megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Késő estére 2 és 12 fok közé hűl le a levegő. Napközben az előrejelzések alapján hidegfront okozhat kellemetlenségeket.

RÉSZLETES ADATOK ÉS ELŐREJELZÉS



Hirdetés



### Renault Kangoo

Négymilliónál jár a legvidámabb doboz



### Húsvéti városlátogatás Debrecenben

Szállás reggelivel, wellnessel, ajándék élményfürdő belépővel.



FORD CARNET

www.carnet.hu/ford

### Ford Puma Titanium

Már 7 199 000 Ft-tól Ford Credit kedvezménnyel\*



### Használt autók garanciával!

Minősített használt autó szerződéses garanciával



### Opel Mokka – a jövő jelen ideje

Már 7 790 000 Ft-tól, akár 0% THM Opel finanszírozással!



### Kire veszélyes igazán Magyar Péter?

Adatvédelem



Iratkozz fel hírlevelünkre!

FELIRATKOZOM

Impresszum

Felhasználási feltételek

Adatkezelés

LABOREREDMÉNYEK



GYÓGYSZERKERESŐ



BETEGSÉGEK



SZAKMAI TARTALMAK



HASZNOS



házipatika

Copyright © 1999-2024 Centrál Média csoport Zrt. info@hazipatika.com