

[Főoldal](#) / [Gyógyszerkereső](#)

Varivax por és oldószer

betegtájékoztató

1. Milyen típusú gyógyszer a Varivax és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Varivax felnőttek és gyermekek bárányhimlős megbetegedése elleni védekezést segítő vakcina. A vakcinák arra használatosak, hogy megvédjék Önt és gyermekét a fertőző megbetegedésektől.

A vakcina 12 hónapos és ennél idősebb személyeknek adható.

A Varivax beadható 9 és 12 hónapos kor közötti csecsemőknek olyan különleges körülmények esetén, mint például a nemzeti oltási kampány előírásai, illetve járványveszély.

A Varivax olyan személyeknek is adható, akiknek bárányhimlős megbetegedéséről nincs ismeret, de bárányhimlős személlyel közvetlen kapcsolatba kerültek.

A védőoltás a feltételezett fertőzést követő 3 napon belül meggátolhatja a betegség kialakulását, vagy módosíthatja a fertőzés lefolyását, melynek következtében kevesebb kiütés keletkezik és a betegség lefolyása rövidebb lesz. Továbbá, korlátozott mennyiségű információ szerint a fertőzést követő legfeljebb 5 napon belül beadott oltóanyag csökkentheti a megbetegedés súlyosságát.

Mint az egyéb vakcinák, úgy a Varivax sem véd meg minden beoltott személyt a természetes úton szerzett bárányhimlő vírusfertőzéstől.

VARIVAX POR ÉS OLDÓSZER GYÓGYSZERINFÓK

Hatóanyag

varicella

Gyártó:

MSD Pharma

[További gyógyszerek azonos hatóanyaggal >](#)

Vényköteles?

vényköteles



A gyógyszer orvosi receptre alkalmazható: [Orvoskereső](#)

Kiszerezések

szuszpenziós injekcióhoz

Betegtájékoztató tartalom

Tartalomjegyzék

2. Tudnivalók a Varivax alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a Varivax-ot

- ha Ön vagy gyermeke allergiás bármelyik bárányhimlő vakcinára, a vakcina bármelyik összetevőjére, (beleértve a zselatint, neomicint, vagy bármely egyéb a 6. pontban felsorolt összetevőt);
- ha Ön vagy gyermeke vérképződési rendellenességben, vagy bármilyen rosszindulatú elváltozásban - mint például fehérvérűség (leukémia) vagy rosszindulatú nyirokdaganat (limfóma) - szenved, mely befolyásolja az immunrendszer működését;
- ha Ön vagy gyermeke az immunrendszer működését gyengítő kezelésben részesül (beleértve a nagy dózisu kortikoszteroidokkal történő kezelést);
- ha Önnek vagy gyermekének olyan betegsége van (mint például a humán immundeficiencia vírus - HIV, vagy a szerzett immunhiányos tünetegyüttes - AIDS) vagy olyan gyógyszert szed, amely gyengíti az immunrendszerét. Az Ön vagy gyermeke immunvédelmi

szintjétől függ, hogy megkaphatja-e az oltást.;

- ha Önnek vagy gyermekének olyan családtagja van, akinek az immunrendszere veleszületetten csökkent működésű, illetve a családi kórtörténetben csökkent működésű immunrendszer szerepel;
- ha Ön vagy gyermeke aktív, kezeletlen tuberkulózisban (gümőkór) szenved;
- ha Önnek vagy gyermekének $>38,5^{\circ}\text{C}$ -ot meghaladó láza van; mindazonáltal, a hőemelkedés önmagában nem ok a védőoltás beadásának elhalasztására;
- ha Ön terhes. Ezen felül el kell kerülni a teherbe esést az oltást követő 1 hónapban.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

A beoltott személynek törekednie kell arra, hogy elkerülje a fogékony, kiemelten veszélyeztetett egyénnel való közeli érintkezést az oltást követő 6 hétben.

Az alábbi esetekben különös elővigyázatosság szükséges:

- Ha az oltás után Ön olyan egyénnel találkozik, akik az alábbi kategóriák egyikébe tartoznak:
- legyengült immunrendszerű egyének.
- terhes nők, akik nem betegedtek meg korábban bárányhimlőben.
- újszülött csecsemők, akik édesanyja nem betegedett meg korábban bárányhimlőben.

Ezek az egyének elkapják a bárányhimlőt attól, akit éppen beoltottak.

- Ha Ön rendszeresen kerül szoros kapcsolatba olyan egyénnel, akiknél súlyos bárányhimlő alakulhat ki, ha elkapják az oltóanyag okozta fertőzést Öntől.

Tájékoztassa kezelőorvosát, mielőtt gyermeke Varivax-ot kap:

- Ha Önnek vagy gyermekének legyengült az immunrendszere (például HIV-fertőzés miatt). Önt vagy gyermekét gondos megfigyelés alatt kell tartani, mert előfordulhat, hogy a védőoltásra adott válasz nem lesz elegendő ahhoz, hogy védelmet biztosítson a betegség ellen (lásd 2. pont „Ne alkalmazza a Varivax-ot”).

Egyéb gyógyszerek (vagy vakcinák) és a Varivax:

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét az Ön vagy gyermeke jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről (vagy egyéb oltásokról).

Amennyiben bármilyen egyéb vakcinát a Varivax-szal egyidőben, vagy közel azonos időben kell megkapnia, orvosa vagy az orvos asszisztense felvilágosítja Önt arról, hogy ez lehetséges-e. A Varivax adható azonos időben a következő általános gyermekoltásokkal: kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni védőoltás (MMR), *Haemophilus influenzae* b típusa elleni védőoltás, hepatitisz B, diftéria, tetanusz, számarköhögés és a szájon át alkalmazott gyermekbénulás elleni vakcina.

Az oltást legalább 5 hónappal el kell halasztani bármely vér- vagy plazmaátömlesztést, valamint a normál humán immunglobulin (véradók által adott emberi vérből kinyert, természetesen termelt antitestek steril oldata) vagy varicella zoster immunoglobulin (VZIG) adását követően.

A Varivax oltást követően Önnek vagy gyermekének 1 hónapig nem szabad immunglobulint, beleértve VZIG-et, kapnia, kivéve, ha orvosa azt szükségesnek tartja.

A beoltottnak a Varivax védőoltást követő 6 héten belül nem szabad szalicilátot (pl. acetilszalicilsavat vagy aszpirint) tartalmazó készítményt szedni, mivel súlyos következményekkel járó, ún. Reye-szindrómát okozhat, mely az összes szervet érintheti.

Terhesség és szoptatás

A Varivax beadása terhes nőknek tilos.

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, az oltás beadása előtt beszéljen kezelőorvosával. Fontos, hogy az oltás beadását követően 1 hónapig ne essen teherbe. A terhesség megakadályozása érdekében ebben az időszakban hatásos fogamzásgátlást kell alkalmaznia.

Közölje orvosával, ha Ön szoptat, vagy szoptatni szándékozik. Orvosa fogja eldönteni, hogy a Varivax beadására sor kerüljön-e.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nem áll rendelkezésre olyan információ, mely szerint a Varivax hatással lenne a gépjárművezetői, vagy a gépek kezeléséhez szükséges képességekre.

3. Hogyan kell alkalmazni a Varivax-ot?

A Varivax-ot orvos vagy más egészségügyi dolgozó adja be.

A Varivax-ot injekció formájában, az alábbiak szerint kell beadni:

- 9 és 12 hónapos kor közötti csecsemők:

Különleges körülmények miatt (nemzeti oltási kampány előírásai vagy bárányhimlő járványveszély) a Varivax-ot be lehet adni 9 és 12 hónapos kor között. A bárányhimlő elleni optimális védelem biztosítása érdekében két adag Varivax-ra van szükség, melyek beadása között legalább 3 hónapnak kell eltelnie.

- 12 hónapos és 12 éves kor közötti gyermekek:

A bárányhimlő elleni optimális védettség eléréséhez két adag Varivax-ot kell beadni legalább egy hónap különbséggel.

- 12 hónapos és 12 éves kor közötti, tünetmentes HIV-fertőzésben szenvedő gyermekek:

Két adag Varivax injekció adandó 12 hetes időköz tartásával. További információért kérjük, forduljon orvosához.

- 13 éves és idősebb serdülők és felnőttek:

Két adag Varivax injekció adandó. A második adagot 4-8 héttel az első adag után kell beadni.

Az adagok számát és a beadásuk idejét a kezelőorvosa fogja meghatározni a hivatalos ajánlások alapján.

A Varivax 9 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek nem adható.

A Varivax-ot a külső comb vagy a felkar területén az izomba, vagy a bőr alá kell beadni. Izomba adandó injekciók esetében az előnyben részesített beadási hely kisgyermeknél általában a comb területe, míg idősebb személyeknél a felkar területe.

Amennyiben Ön véralvadási rendellenességben szenved vagy vérében alacsony a vérlemezkék szintje, az injekciót a bőr alá fogja kapni.

Orvosa vagy a beadást végző egészségügyi dolgozó ügyelni fog arra, hogy a Varivax ne a vérkeringésébe kerüljön beadásra.

Ha az előírtnál több Varivax került alkalmazásra

A túladagolás nagyon valószínűtlen, mivel az oltóanyag egyszeres kiszerezésű injekciós üvegben van és orvos vagy más egészségügyi dolgozó adja be.

Ha úgy gondolja, hogy nem kapta meg a Varivax egy adagját

Tájékoztassa orvosát, aki eldönti, hogy szükség van-e az adagra és mikor kell azt beadni.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden vakcina, így ez a vakcina is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nagyon ritkán (10 000 emberből kevesebb, mint 1-nél észlelték) súlyos allergiás reakció léphet fel, melynek tünetei közé tartozhat az arc duzzanata, alacsony vérnyomás és nehézlégzés, kiütésekkel vagy anélkül. Ezek a reakciók gyakran nagyon hamar fellépnek az injekció beadását követően. Ha az oltást követően ezen tünetek bármelyikét tapasztalja, vagy egyéb súlyos tüneteket észlel, azonnal forduljon orvoshoz.

Értesítse orvosát, ha az alábbi ritka vagy nagyon ritka mellékhatások bármelyikét tapasztalja:

- a szokásosnál nagyobb véraláfutási vagy vérzési hajlam; vörös vagy lila színű, lapos, tűszúrászerű kiütések a bőr alatt, nagyfokú sápadtság
- súlyos bőrkiütések (fekélyek és hólyagok, melyek a szemek, száj és/vagy nemi szervek környékén jelenhetnek meg; piros, gyakran viszkető pöttyök, melyek a végtagokon keletkeznek és néha az arcon vagy a test többi részén is (Stevens-Johnson szindróma, eritéma multiforme);
- izomgyengeség, rendellenes érzékelés, bizsergés a karokban, lábakban és a törzs felső részén (Guillain-Barré szindróma);
- láz, hányinger, hányás, fejfájás, nyakmerevség és fényérzékenység (agyhártyagyulladás);
- sztrók;
- görcsök (rohamok) lázzal vagy anélkül.

A következő mellékhatásokat figyelték meg:

Nagyon gyakori (10 emberből több mint 1 esetén észlelt) mellékhatások:

- láz
- a bőr bevörösödése, fájdalom/érintésre érzékenység/kellemetlen érzés és duzzanat az injekció beadásának helyén.

Gyakori (10 emberből kevesebb mint 1, de 100 emberből több mint 1 esetén észlelt) mellékhatások:

- felső légúti fertőzés (orr, torok, légutak)
- irritabilitás
- kiütés, kanyaró-/rózsahimlő-/bárányhimlő-szerű kiütés
- kiütés az injekció beadásának helyén, viszketés az injekció beadásának helyén.

Nem gyakori (100 emberből kevesebb mint 1, de 1000 emberből több mint 1 esetén észlelt) mellékhatások:

- fejfájás, álmoság
- a szemhéj varosodásával járó könnyezés és szemviszketés (kötőhártya-gyulladás)
- köhögés, orrdugulás, légúti panaszok, orrfolyás, étvágytalanság, influenza

- gyomorpanaszok hányással, görcsök, vírusos hasmenés
- hasmenés, hányás (gastroenteritisz)
- fülfertőzés, torokfájás
- sírás, álmatlanság, alvászavarok
- vírusos bárányműködés, vírusos megbetegedés, bőrgyulladás, pelenkakiütés, bőrpír, izzadságkiütés, csalánkiütés
- gyengeség/ fáradtság, általános rossz közérzet, az injekció beadási helyén fellépő reakciók, ide értve a csalánkiütésre emlékeztető kiütéseket, zsibbadás, vérzés, véraláfutás, a bőrből kiemelkedő bőrkeményedés, melegség érzése, meleg tapintás.

Ritka (1000 emberből kevesebb mint 1, de 10 000 emberből több mint 1 esetén észlelt) mellékhatások:

- nyirokcsomó-duzzanat, a szokásosnál nagyobb véraláfutási vagy vérzési hajlam
- érzéketlenség, idegesség, izgatottság, aluszékonyság, rendellenes álmok, érzelmváltozások, járási nehézség, lázgörcsök, remegés
- szemhéjduzzanat, szemirritáció
- fül-fájás
- orrdugulás érzete vagy teltségérzés az orrban néha lüktető fájdalommal és nyomásérzéssel vagy fájdalommal az arc területén (arcüreggyulladás), tüszentés, orrfolyás (rinitisz), tüdővízenyő, orrvérzés, zihálás, a tüdőhöz vezető légutak duzzanata (hörghurut), tüdőfertőzés, súlyos tüdőfertőzés lázzal, hidegrázás, köhögés, vizenyő és légszomj (tüdőgyulladás)
- fájdalmas fehér foltok a szájbán (gombafertőzés), influenza-szerű megbetegedés, nem mérgező harapás/csípés
- hasfájás, gyomorbántalmak és hányinger, túlzott gázképződés a gyomorban, véres széklet, szájfekély
- kipirulás, hólyagosodás, bőrrendellenességek és fertőzések (akne, véraláfutás, herpeszkiütés, ekcéma, csalánkiütés, kanyaró és napégés)
- izom/csontfájdalom, izomfájás, csípő-, láb-, vagy nyakfájdalom, izommerevség
- vér-, vagy folyadékzivárgás az erekből
- az injekció beadásának helyén fellépő reakciók, ide értve: bőrelszíneződés, trauma, durva bőr/bőrszárazság, ajakduzzanat.

A Varivax forgalomba hozatalt követő felhasználása során jelentett mellékhatások közé tartoznak:

- idegrendszeri megbetegedések (agyi és/vagy gerincvelő), csüngő szemhéj és izmok az arc egyik felén (Bell-féle bénulás), bizonytalan járás, szédülés, zsibbadás vagy érzéketlenség a kezekben és lábfejekben,
- övsömör, torokfájás (faringitisz), lila vagy pirosas-barnás, a bőr alatt látható kiütések (Henoch-Schönlein purpura), a bőr és lágszövetek másodlagos bakteriális fertőzései, ide értve az ótvart és cellulitist is, varicella (bárányműködés),
- aplasztikus anémia, melynek tünetei közé tartozhat a szokásosnál könnyebben kialakuló véraláfutás vagy vérzés; vörös vagy lila színű, lapos, tűszúrászerű kiütések a bőr alatt, nagyfokú sápadtság,

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél vagy gyermekénél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK ÉS CIKKEK

[Varivax oltás és terhesség](#)

[Kiütéses gyermekkori betegségek](#)

[Kötelező és ajánlott védőoltások gyermekkorban](#)

[Kiütéses fertőző betegségek](#)

[Az övsömör](#)

[Oltási napló - Tesztelje tudását!](#)

5. Hogyan kell a Varivax-ot tárolni?

A vakcina gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne használja ezt a vakcinát.

A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Hűtőszekrényben tárolandó (2 °C - 8 °C). Nem fagyasztható! A fénytől való védelem érdekében az injekciós üveget tartsa a dobozában.

Semmilyen vakcinát ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, mit tegyen a már nem használt vakcináival. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Varivax

A készítmény hatóanyaga: élő attenuált (legyengített) bárányhimlő (varicella) vírus (Oka/Merck törzs) (humán diploid sejteken (MRC-5) előállítva).

Az elkészített vakcina minden egyes 0,5 ml-es adagja tartalmaz: legalább 1350 PFU (plakk formáló egység) (Oka/Merck törzsű) bárányhimlő vírust.

Egyéb összetevők:**Por:**

Szacharóz, hidrolizált zselatin, karbamid, nátrium-klorid, nátrium-L-glutamát, vízmentes dinátrium-hidrogén-foszfát, kálium-dihidrogén-foszfát és kálium-klorid.

Maradványanyagok, amelyeket az oltóanyag nyomokban tartalmazhat: neomicin.

Oldószer:

Injekcióhoz való víz.

Milyen a Varivax készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

A vakcina tartalma: fehér-csaknem fehér por, egyadagos injekciós üvegben és oldószer tiszta, színtelen folyadék formájában, előretöltött fecskendőben. A vakcina egy, illetve tíz adagos csomagolásban elérhető.

Az oldószer injekcióhoz való víz formájában, előretöltött fecskendőben kerül csomagolásra tűvel vagy anélkül.

A tű nélküli kiszerezés másodlagos csomagolása 2 különálló tűt is tartalmazhat.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Millennium Tower III., 3. em.

Gyártó

Merck Sharp & Dohme, Waarderweg 39 PO Box 581, NL-2003 Harlem, Hollandia

Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neveken engedélyezték:

Varivax

Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Norvégia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, Nagy-Britannia;

Provarivax

Belgium, Dánia, Luxemburg, Hollandia.

A betegájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. január

TOVÁBBI GYÓGYSZEREK AZONOS HATÓANYAGGAL

[PRIORIX-TETRA por és oldószer oldatos injekcióhoz](#)

[PRIORIX-TETRA por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben](#)

[Varilrix por és oldószer oldatos injekcióhoz](#)

[Valamennyi gyógyszer varicella hatóanyaggal](#)

Hirdetés

Hirdetés

PARTNEREINK HÍREI



Köhög? Ne törődjön bele
Mit tehetünk a köhögés ellen? (x)



Férfiégészség
A hialuronsav és a gyógynövények szerepe. (x)

ORVOS VÁLASZOL



Dr. Parrag Hanga
Gyermekgyógyász

- > Lineáris IgA, dermatosis vs....
- > Voltam-e bárányhimlős
- > Övsömör 9 évesen

Hirdetés

[WEBBeteg cikkek](#)

[Betegségek](#)

[Életmód](#)

[Médiatár](#)

[Egészség tesztek](#)

[Orvosmeteorológia](#)

[Orvos válaszol](#)

[Keresők, adattárak](#)

[Médiaajánlat](#)

[Impresszum, kapcsolat](#)

[Szakértőink](#)

[Adatvédelem és felhasználási feltételek](#)

E-mail: info@webbeteg.hu



© 2008-2024 Webbeteg Kft.